



## ملاحظات مُهمّة: اقرأ أولاً

يُرجى قراءة هذه المعلومات بعناية.

كما نُشجّعك على طرح الأسئلة حول المعلومات الواردة. ويُمكنك أيضاً إن رغبت مناقشة المعلومات الموجودة في نشرة معلومات المرضى هذه مع إخصائي الرعاية الصحيّة الخاص بكِ أو أيّ من أصدقائكِ أو أفراد أسرتك.

ونوصيكِ بالاحتفاظ بنشرة معلومات المرضى هذه في حالة الحاجة لمراجعتها مُستقبلاً. يُمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من إخصائي الرعاية الصحيّة الخاص بكِ أو خط المعلومات الصحيّة 1-1-8.

تحتوي نشرة معلومات المرضى على معلومات تتعلق بإنهاء الحمل الطبيّ.





## الأدوية المُستخدمة لإنهاء الحمل: Misoprostol و Mifepristone

تحتوي كل غبوة من دواء Mifegymiso على غبوة واحدة خضراء اللون من دواء **Mifepristone** وغبوة واحدة برتقالية اللون من دواء **Misoprostol**.

يجب استخدام كلا الدواءين لإنهاء الحمل الطبي: Misoprostol و Mifepristone.

يُعد دواء Mifepristone أحد المُثبِّطات الهرمونيَّة. ويعمل عن طريق منع آثار هرمون البروجيستيرون، وهو هرمون ضروري لاستمرار الحمل.

بينما يُعد دواء Misoprostol أحد مُشتقات البروستاغلاندين ويعمل عن طريق إحداث انقباضات في الرحم مع استرخاء عُنق الرحم مما يُساعد على دفع مُحتويات الرحم للخارج.

يعمل كلُّ من Misoprostol و Mifepristone معاً لإنهاء الحمل.

تُوفر هذه النشرة معلومات حول استخدام Misoprostol و Mifepristone لإنهاء الحمل.

قبل تناول الأدوية، ينبغي عليك زيارة إخصائي الرعاية الصحيَّة الخاص بك والذي سيُجري لك فحصاً جسدياً وقد يُجري كذلك فحصاً بالموجات فوق الصوتيَّة. إذا حدَّد إخصائي الرعاية الصحيَّة الخاص بك أن مدة حملك لم تتجاوز 63 يوماً وكان الإنهاء الطبي مُلائماً لك، فمن ثمَّ تُصبحين مُؤهلة لبدء العلاج.



















